

KLINISCHE BRONCHOSCOPIE

Een *bronchoscopie* is een onderzoek van de luchtwegen.
In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en
hoe u zich hierop voorbereidt.

Naam:

Afspraak

Datum:

.....

Tijd:

.....

Wat is een klinische bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek van de luchtwegen. De arts bekijkt de structuur van het slijmvlies en gaat na of er sprake is van ontstekingen of afwijkingen.

Klinisch wil zeggen dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Een bronchoscoop is een buigzame slang met aan het uiteinde een lampje. Hiermee worden de binnenkant van de luchtwegen en de grootste luchtpijpvertakkingen verlicht, zodat de arts deze goed kan bekijken. Eventueel wordt via de slang een klein stukje weefsel weggenomen, geborsteld en/of wordt er wat slijm afgezogen voor onderzoek in het laboratorium.

Hoe bereid ik me voor?

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek nuchter bent. U mag daarom vanaf 24.00 uur op de avond voor het onderzoek niet meer eten of drinken.

Gebruikt u medicijnen, dan mag u deze 's ochtends gewoon innemen (behalve als dit plastabletten zijn).

Het onderzoek

- U wordt met rolstoel of bed naar de onderzoekskamer gebracht, waar u plaatsneemt op de onderzoekstafel of in de speciale onderzoeksstoel.
- U krijgt een kapje om uw vinger om uw zuurstof en hartslag te controleren. Draagt u een kunstgebit, dan verzoeken wij u dit voor het onderzoek uit te nemen.
- Met tussenpozen wordt uw keel verdoofd met een spray. Dit geeft een bittere smaak en *het gevoel* van een verdoofde keel. Hierdoor kunt u moeilijk slikken, maar dit herstelt zich binnen twee uur. Tijdens deze twee uur mag u niet eten of drinken.
- Nadat de spray is toegediend, wordt de bronchoscoop via de mond en keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. Nu kan de arts uw luchtwegen bekijken.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Omdat uw keel verdoofd is, mag u pas na twee uur weer drinken (te beginnen met water) en na drie uur weer eten. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt.

Complicaties en bijwerkingen

Complicaties komen bij dit onderzoek zeer zelden voor.

Het kan zijn dat u bloederig slijm ophoest. Dit is een normaal verschijnsel na een bronchoscopie. We vragen u dit slijm altijd even aan de verpleegkundige te laten zien.

Wanneer u klachten van benauwdheid heeft, wordt er een röntgenfoto gemaakt.

De uitslag

Uw huisarts geeft u de uitslag van het onderzoek, zodra hij deze van de behandelend arts ontvangen heeft. In sommige gevallen kan de behandelend arts u alvast een voorlopig verslag geven. Wanneer hij echter stukjes weefsel heeft weggenomen voor nader onderzoek, laat de uitslag wat langer op zich wachten. U krijgt dan na enkele dagen bericht.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundige of met uw behandelend arts.

Telefoonnummer

Afdeling Radiologie: (024) 68 59 228