

POLIKLINISCHE BRONCHOSCOPIE

Een *bronchoscopie* is een onderzoek van de luchtwegen.
In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en
hoe u zich hierop voorbereidt.

Afspraak

Datum:

.....

Tijd:

.....

Wat is een poliklinische bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek van de luchtwegen. De arts bekijkt de structuur van het slijmvlies en gaat na of er sprake is van ontstekingen of afwijkingen. Poliklinisch wil zeggen dat u voor dit onderzoek niet wordt opgenomen. U mag vlak na het onderzoek weer naar huis.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Een bronchoscoop is een buigzame slang met aan het uiteinde een lampje. Hiermee worden de binnenkant van de luchtwegen en de grootste luchtpijpvertakkingen verlicht, zodat de arts deze goed kan bekijken. Eventueel wordt via de slang een klein stukje weefsel weggenomen, geborsteld en/of wordt er wat slijm afgezogen voor onderzoek in het laboratorium.

Hoe bereid ik me voor op het onderzoek?

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek nuchter bent. U mag daarom vanaf 24.00 uur op de avond voor het onderzoek niet meer eten of drinken. Gebruikt u medicijnen, dan mag u deze 's ochtends wel gewoon innemen (behalve als dit plastabletten zijn). Plastabletten kunt u pas twee uur na het onderzoek weer innemen. Wij verzoeken u iemand mee te nemen ter begeleiding, omdat u zelf na het onderzoek niet naar huis mag rijden.

Het onderzoek

- U meldt zich op de afgesproken tijd op de polikliniek ingang C van het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald.
- In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel of in een speciale onderzoeksstoel. U krijgt een kapje om uw vinger om uw zuurstof en hartslag te controleren. Draagt u een kunstgebit, dan verzoeken wij u dit voor het onderzoek uit te nemen.
- Met tussenpozen wordt uw keel verdoofd met een spray. Dit geeft een bittere smaak en *het gevoel* van een verdoofde keel. Hierdoor kunt u moeilijk slikken, maar dit herstelt zich binnen twee uur. Tijdens deze twee uur mag u niet eten of drinken.
- Nadat de spray is toegediend, wordt de bronchoscoop via de mond en keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. Nu kan de arts uw luchtwegen bekijken.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Als u zich goed voelt, kunt u een uur na het onderzoek en met toestemming van de bronchoscopie-assistent weer naar huis. Omdat uw keel verdoofd is, mag u pas na twee uur weer drinken (te beginnen met water) en na drie uur weer eten. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt.

Complicaties en bijwerkingen

Complicaties komen bij dit onderzoek zeer zelden voor. Het kan zijn dat u bloederig slijm ophoest. Dit is een normaal verschijnsel na een bronchoscopie. We vragen u dit slijm altijd even aan de verpleegkundige te laten zien.

Wanneer u klachten van benauwdheid heeft, wordt er een röntgenfoto gemaakt.

De uitslag

Uw huisarts geeft u de uitslag van het onderzoek zodra hij deze van de behandelend arts ontvangen heeft. In sommige gevallen kan de behandelend arts u alvast een voorlopig verslag geven. Wanneer hij echter stukjes weefsel heeft weggenomen voor nader onderzoek, laat de uitslag wat langer op zich wachten. U krijgt dan na enkele dagen bericht.

Wat doe ik als ik verhinderd ben?

Als u onverhoopt verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op om een nieuwe afspraak te maken: (024) 68 59 220

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek of uw behandelend arts.

Telefoonnummer

Afdeling Radiologie: (024) 68 59 228